

**Tabel 17.** Overzicht van de bijwerkingen die kunnen voorkomen na een bepaald vaccin.

Vaccin	Bijwerkingen	Frequentiecategorie <sup>1</sup>	Geopperde bijwerkingen die op basis van wetenschappelijk onderzoek verworpen worden
<b>Alle vaccins</b>	Lokale bijwerkingen (pijn, zwelling, roodheid) (Deel 0)	zeer vaak	Wiegendood Allergie/astma Diabetes mellitus type 1
	Koorts (40)	vaak	
	Anafylaxie (Deel 0)	zeer zelden	
<b>IPV</b>			
<b>DTPa</b>	Uitgebreide zwelling rond injectieplaats (Deel 0)	vaak na vierde of vijfde dosis	Hersenbeschadiging <sup>2</sup>
	Algemene verschijnselen (waaronder moeheid, nausea, braken en gedaalde eetlust)	vaak	
	Hoge koorts (> 40,5 °C)	zeer zelden	
	Ontroostbaar huilen (>3u)	zelden (bij zuigelingen)	
	Koortsstuipen	zeer zelden	
	Hypotone hyporesponsive episode <sup>3</sup>	zeer zelden	
<b>dTpa/dT</b>	Algemene verschijnselen (waaronder spierpijn, moeheid, nausea en gedaalde eetlust)	zeer vaak	Hersenbeschadiging <sup>2</sup>
	Uitgebreide zwelling rond injectieplaats (Deel 0)	soms	
	Syncope (Deel 0)	komt het meest voor bij meisjes van 11 tot 18 jaar	
<b>MBR</b>	Rash/exantheem	vaak	Autisme Ziekte van Crohn Colitis ulcerosa
	Koortsstuipen	zelden	
	Neurologische verschijnselen <sup>4</sup>	zeer zelden	
	Lymfadenopathie	niet bij kinderen, vaak bij volwassenen	
	Idiopatische trombocytopenische purpura (ITP)	zeer zelden	
	Gewrichtsklachten	zeer vaak bij volwassen vrouwen	
	Syncope (Deel 0)	komt het meest voor bij meisjes van 11 tot 18 jaar	

<b>MenC</b>	Systemische bijwerkingen (vb. hoofdpijn, vermoeidheid, koorts, spierpijn, gedaalde eetlust)	vaak	
	Syncope (Deel0)	komt het meest voor bij meisjes van 11 tot 18 jaar	
<b>HBV</b>	Syncope (Deel 0)	komt het meest voor bij meisjes van 11 tot 18 jaar	Multipele sclerose (MS)
<b>HPV</b>	Algemene verschijnselen (vb. spierpijn, moeheid of hoofdpijn)	zeer vaak	
	Syncope (Deel 0)	komt het meest voor bij adolescenten	

<sup>1</sup> Frequentie categorieën waarin ongewenste verschijnselen in de bijsluiters vermeld moeten worden:

Zeer vaak	>1:10	Zelden	>1:10.000, maar <1:1000
Vaak	>1:100, maar <1:10	Zeer zelden	<1:10.000
Soms	>1:1000, maar <1:100		

<sup>2</sup> In geen enkel onderzoek werd onherstelbare neurologische schade of overlijden in verband gebracht met de onderzochte acellulaire vaccins (2).

<sup>3</sup> Triade van symptomen: plots verlies van tonus, gebrek aan contact en bleekheid. Een hypotone hyporesponsieve episode (HHE) of collaps begint plots, treedt op binnen de 48 uren na de vaccinatie, duurt 1 minuut tot 48 uren. Het komt enkel voor bij kinderen jonger dan 10 jaar (37).

<sup>4</sup> Neurologische verschijnselen na MBR-vaccin kunnen zijn: hypotonie, hypertonie, prikkelbaarheid, bewustzijnsdaling, atypische convulsies en encefalitis (2).