

# Voorbeeld inhaalschema's voor ongevaccineerde leerlingen – 2023v3

## < 5 jaar

moment	minimuminterval	vaccin
M0		Hexyon + MMRVaxPRO
M2	8w na M0	Hexyon + Neisvac
M8	6m na M2	Hexyon

## 5-12 jaar

moment	minimuminterval	vaccin <sup>3</sup> - optie 1	vaccin <sup>3</sup> - optie 2
M0		Tetravac + MMRVaxPRO	Hexyon + MMRVaxPRO
M1	4w na M0	MMRVaxPRO <sup>1</sup> + Engerix B <sup>2</sup>	
M2	8w na M0	Tetravac + (Engerix B) <sup>2</sup>	Hexyon + MMRVaxPRO <sup>1</sup>
M7	6m na M1 en 3m na M3	Neisvac + Engerix B <sup>2</sup>	
M8	6m na M2	Tetravac	Hexyon + Neisvac

<sup>1</sup> Voor leerlingen > 10 jaar.

<sup>2</sup> Leerlingen tussen de leeftijd van 11 en 15 jaar krijgen een schema met 2 volwassen doses Engerix B 20 (0-6m). Voor jongere kinderen wordt een schema met 3 pediatrische doses toegediend die voorgeschreven worden door de huisarts of kinderarts.

<sup>3</sup> Leerlingen in ISO hebben recht op een inhaalvaccinatie tegen HPV. Gardasil 9 kan, met een interval van minimum 5 maanden tussen de 2 doses, simultaan of met om het even welk interval na een ander vaccin, toegediend worden.



## 13-18 jaar

moment	minimuminterval	vaccin <sup>2</sup>
M0		Boostrix + Imovax
M1	4w na M0	MMRVaxPRO + Engerix B 20 <sup>1</sup>
M2	8w na M0	Boostrix + Imovax
M3		Neisvac + MMRVaxPRO
M7	6m na M1	Engerix B 20 <sup>1</sup>
M8	6m na M2	Boostrix + Imovax

<sup>1</sup> Boven de leeftijd van 15 jaar dient een derde dosis HBV toegediend te worden in een schema van minimum 0-1-6.

<sup>2</sup> Leerlingen tot en met het derde jaar secundair hebben recht op een inhaalvaccinatie tegen HPV. Gardasil 9 kan, met een interval van minimum 5 maanden tussen de 2 doses, simultaan of met om het even welk interval na een ander vaccin toegediend worden.

## > 18 jaar

moment	minimuminterval	vaccin	vb
M0		Boostrix + MMRvaxPro	okt
M1	4w na M0	Boostrix + Engerix B20	Nov
M2	8w na M0	Engerix B20 + MMRvaxPro	dec
M3	6m na M0	Boostrix + Engerix B20	april

