

VACCINATIESTATUS IN ORDE?

De vaccinatiestatus wordt naar aanleiding van elk systematisch contactmoment nagekeken:

1. Controleer het aantal reeds toegediende dosissen
2. Controleer de leeftijd waarop het vaccin is toegediend
3. Controleer het interval tussen de vaccinaties

	MBR	MENC OF ACWY	DTPA-HBV-IPV	DTPA-IPV / DTPA	HPV																
K1	1 dosis toegediend na de leeftijd van 50 w	1 dosis toegediend na de leeftijd van 12 m	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SCHEMA 3 DOSISSEN</th> <th>SCHEMA 4 DOSISSEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOSIS 1: $\geq 8W$</td> <td>DOSIS 1: $\geq 6W$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$\geq 8w$</td> <td style="text-align: center;">$\geq 4w$</td> </tr> <tr> <td>DOSIS 2</td> <td>DOSIS 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$> 6m$</td> <td style="text-align: center;">$\geq 4w$</td> </tr> <tr> <td>DOSIS 3: $\geq 50W$</td> <td>DOSIS 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">$\geq 6m$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DOSIS 4: $\geq 50W$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Indien HBV monovalent is toegediend: 3 dosissen met minimum 4w tussen D1 en D2, minimum 8w tussen D2 en D3 en minimum 16w tussen D1 en D3. Er geldt geen minimumleeftijd voor D1, ook een dosis toegediend bij de geboorte wordt in rekening gebracht.</p>	SCHEMA 3 DOSISSEN	SCHEMA 4 DOSISSEN	DOSIS 1: $\geq 8W$	DOSIS 1: $\geq 6W$	$\geq 8w$	$\geq 4w$	DOSIS 2	DOSIS 2	$> 6m$	$\geq 4w$	DOSIS 3: $\geq 50W$	DOSIS 3		$\geq 6m$		DOSIS 4: $\geq 50W$	Zie DTPa-HBV-IPV	NVT
SCHEMA 3 DOSISSEN	SCHEMA 4 DOSISSEN																				
DOSIS 1: $\geq 8W$	DOSIS 1: $\geq 6W$																				
$\geq 8w$	$\geq 4w$																				
DOSIS 2	DOSIS 2																				
$> 6m$	$\geq 4w$																				
DOSIS 3: $\geq 50W$	DOSIS 3																				
	$\geq 6m$																				
	DOSIS 4: $\geq 50W$																				
L1				<ul style="list-style-type: none"> • 1 herhalingsinenting op leeftijd 5-7 jaar, indien minder dan 12 maanden geleden 																	
L4	D1 na de leeftijd van 50 w																				



VACCINATIESTATUS IN ORDE?

	MBR	MENC OF ACWY	DTPA-HBV-IPV	DTPA-IPV / DTPA	HPV
	D2 op leeftijd 9-10 jaar en ≥ 4 w na D1			<p>reeds werd toegediend, is een herhalingsinenting DTPa-IPV in L1 niet nodig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indien pas in L1 (of later) wordt gemerkt dat de booster dosis DTPa-HBV-IPV aanbevolen op ≥ 50 weken ontbreekt, dan wordt de herhalingsinenting met DTPa-HBV-IPV-Hib aangeboden ipv met DTPa-IPB (de ontbrekende dosis hoeft niet meer ingehaald te worden). Het interval tussen de 2de en 3de dosissen HBV is namelijk onvoldoende lang. Indien dTpa werd toegediend als herhalingsinenting ipv DTPa-IPV dan moet nog bijkomend een IPV worden aangeboden 	
L6	2 dosissen: D1 na de leeftijd van 50 w en D2 ≥ 4 w later				
S3				<ul style="list-style-type: none"> 1 herhalingsinenting dTpa op leeftijd 14-15 jaar. Indien pas in S3 wordt gemerkt dat de herhalingsinenting DTPa-IPV aanbevolen op de leeftijd van 5-7 jaar niet werd gegeven, dan wordt de herhalingsinenting dTpa + IPV aangeboden in S3 (de ontbrekende dosis hoeft niet meer ingehaald te worden). 	2 dosissen (eenzelfde merknaam) met interval ≥ 5 m

- De dosissen die meer dan 5 dagen vóór de aangegeven minimumleeftijd of 5 dagen vóór het einde van het aanbevolen minimuminterval werden toegediend, worden als ongeldig beschouwd.
- Is de vaccinatiestatus van de leerling niet in orde? Bied een aangepast inhaalschema aan.