

Tabel 4 Voorstel inhaalschema voor ongevaccineerde leerling < 5 jaar met gratis vaccins (anno 2013)

moment	minimuminterval	vaccin	vb
M0		Infanrix-hexa	okt
M1	4w na M0	Priorix + Neisvac	nov
M2	8w na M0	Infanrix-hexa	dec
M8	6m na M2	Infanrix-hexa	juni

Tabel 5 Voorstel inhaalschema voor ongevaccineerde leerling 5-12 jaar met gratis vaccins (anno 2014)

moment	minimum-interval	vaccin ³ - optie 1	vaccin ³ - optie 2	vb
M0		Priorix + Infanrix-IPV	Priorix+Infanrix hexa zonder Hib	okt
M1	4w na M0	Priorix ¹ + Engerix B 20 ²		nov
M2	8w na M0	Infanrix-IPV + Engerix B 20 ²	Priorix+Infanrix hexa zonder Hib	dec
M7	6m na M1 en 3m na M3	Neisvac + Engerix B 20 ²		mei
M8	6m na M2	Infanrix-IPV	Infanrix hexa zonder Hib + Neisvac	juni

¹ Voor leerlingen > 10 jaar.

² Voor leerlingen < 11 jaar wordt een halve dosis toegediend in een schema van 3 doses (0-1m-6m).
Leerlingen tussen de leeftijd van 11 en 15 jaar krijgen een schema met 2 volledige doses (0-6m).

³ Meisjes in het 1^{ste} jaar secundair onderwijs hebben recht op een vaccin tegen HPV. Gardasil is een geïnactiveerd vaccin en mag dus met elk mogelijk interval na een ander vaccin toegediend worden.

Tabel 6 Voorstel inhaalschema voor ongevaccineerde leerling 13-18 jaar met gratis vaccins (anno 2014)

moment	minimuminterval	vaccin ²	vb
M0		Boostrix + Imovax	okt
M1	4w na M0	Priorix + Engerix B 20 ¹	nov
M2	8w na M0	Tedivax + Imovax	jan
M3		Neisvac + Priorix	
M7	6m na M1	Engerix B 20 ¹	mei
M8	6m na M2	Tedivax + Imovax	juni

¹ Boven de leeftijd van 15 jaar moet een derde dosis HBV gegeven worden in een schema van minimum 0-1-6. Indien men wenst af te wijken van dit schema moet men de minimumintervallen respecteren: een minimum van 1 maand tussen dosis 1 en 2; dosis 3 volgt op minimum 2 maanden na dosis 2, en minstens 4 maanden na dosis 1.

² Meisjes in het 1^{ste} jaar secundair onderwijs hebben recht op een vaccin tegen HPV. Gardasil is een geïnactiveerd vaccin en mag dus met elk mogelijk interval na een ander vaccin toegediend worden.