

AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID

Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
T 02 553 35 00
F 02 553 35 84
www.zorg-en-gezondheid.be

aan alle CLB-artsen
aan alle CLB-verpleegkundigen
aan de CLB-directies

Contactpersoon	E-mail	Telefoon
Geert Top	geert.top@zorg-en-gezondheid.be	02 553 35 85
Ons kenmerk	Uw kenmerk	Datum
		13.08.2015

beschikbaarheid vaccins schooljaar 2015-2016 - aanpassingen najaar

Geachte collega, geachte heer, mevrouw,

Omwille van het wereldwijde relatieve gebrek aan combinatievaccins tegen polio, difterie, tetanus en pertussis kunnen er dit schooljaar een aantal variaties zijn in het aanbod van de vaccins, meer specifiek voor de leerlingen van het eerste leerjaar. Normaal gezien is voor hen het vaccin Tetravac[®] voorzien, eventueel in Franse verpakkingen Tetravac Pédiatrique[®], maar dan met de informatie met Nederlandstalige bijsluiters.

Omwille van het tekort aan deze vaccins zal er gebruik gemaakt moeten worden van het vaccin Repevax[®] (alternatieve naam in de Benelux Triaxis Polio[®]) wat ook in Vaccinnet besteld kan worden. Repevax[®] kan voor deze doelgroep gebruikt worden, maar is lager gedoseerd voor de componenten tegen difterie, tetanus en kinkhoest; het bevat dan wel 5 antigenen tegen kinkhoest in plaats van 2.

Het heeft geen zin om deze vaccinaties uit te stellen tot er opnieuw Tetravac[®] voorradig zal zijn, omdat we er geen zicht op hebben wanneer deze vaccins voor België/Vlaanderen beschikbaar zullen zijn. Voorlopig wordt dus Repevax[®] gebruikt voor het vaccinatiemoment in het eerste leerjaar. Dit vaccin mag volgens de bijsluiters gebruikt worden vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Voor inhaalvaccinaties bij jonge kinderen (kleuters en lagere school) waarbij ook een hepatitis B vaccin nodig is, gebruikt u best Hexyon[®]. Dit vaccin bevat wel de normale hogere pediatrie dosis van de difterie-, tetanus en kinkhoest-componenten. De extra component tegen *Haemophilus influenzae* type b is vanaf de leeftijd van 5 jaar niet meer nodig, maar het is praktischer om dit combinatievaccin toe te dienen.

Voor inhaalvaccinatie mag Repevax® gebruikt worden in het secundair onderwijs wanneer ook een poliocomponent nodig is, in plaats van Boostrix® + Imovax Polio®. Wanneer geen poliocomponent nodig is, gebruikt u gewoon Boostrix®.

Aangezien Repevax® dezelfde componenten bevat als Tetravac®, maar lager gedoseerd, mag Repevax® met dezelfde andere vaccins terzelfdertijd toegediend worden waar nodig. Wanneer dit anders vermeld staat op de bijsluiter, heeft dit er enkel mee te maken dat het ten tijde van de registratie niet apart bestudeerd geweest is.


Voor de toestemmingsbrieven heeft de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg een aangepast voorstel uitgewerkt voor deze vaccinaties, waarvoor dank.

We hopen dat het niet al te verwarrend zal worden, maar we hebben geen keuze. Voorlopig hebben we gelukkig een alternatief voor het ontbrekende vaccin.

Ter info wil ik nog meedelen dat de Wereldgezondheidsorganisatie de lijst met landen waar vrij poliovirus circuleert recent heeft bijgesteld. Momenteel is dit enkel nog in Afghanistan en Pakistan. Voor wie recent (minder dan 3 maanden geleden) afkomstig is uit deze landen wordt best zo snel mogelijk na aankomst een extra poliovacinatie toegediend. Dit advies geldt ook nog voor mensen recent afkomstig uit Nigeria, Somalië en Kameroen. De lijst is momenteel dus beperkt tot deze 5 landen in plaats van 10 vorig jaar.

Vriendelijke groeten,

Voor het afdelingshoofd, afwezig,



Ruud Mak
Teamverantwoordelijke infectieziektebestrijding en vaccinatie