



HPV Prevention
and Control Board

www.hpvboard.org

HPV VACCINATION PROGRAM IN **BELGIUM** - LESSONS LEARNT AND THE WAY FORWARD

by Corinne Vandermeulen, MD, PhD

Overview of the HPV vaccination program – Recommendation (1)

- Decision for introduction was made by the permanent vaccination committee of the Superior Health Council in 2007 and updated in 2008 and 2017.
- Girls aged 10-13 years of age: vaccine free of charge
Girls up to 18 years could have reimbursement through GPs and pediatricians
- The 10-13 yr old girls program was implemented by the different regions (Flanders and Wallonia-BXL) through school health services (SHS): free consult as well
- Start in September 2010
- In 2017: update of recommendations was made, but has not been published yet



Overview of the HPV vaccination program (2)

- **Organized school-based vaccination**

- Flanders: 1st year of secondary school
- Wallonia-BXL: 2nd year of secondary school

however, parents can choose to have their daughters vaccinated by the GP or paediatrician

- **Vaccination coverage**

- Flanders: 2016: **91%** for complete vaccination (16-year old girls vaccinated in 2012)
2012: **83.5%** for complete vaccination (14-year old girls vaccinated in 2010)
- Wallonia-BXL: 2013: **30%** for complete vaccination
2017: new survey done, no results yet



Overview of the HPV vaccination program (3)

Reasons for difference between Flanders and Wallonia-BXL

- 1st year of the program: 25% of the SHS did not participate
- 2nd year: free of choice for SHS to offer this vaccine
- Vaccination through SHS is less implemented in Wallonia-BXL
- Influence of France and French press

→ Currently, a lot of efforts are made to improve the vaccination coverage in Wallonia-BXL



Overview of the HPV vaccination program (4)

- Training and information sources for general public and vaccinators
 - Flanders:
 - Parents: School Health Services, GP, Pharmacist,
 - Vaccinators: Scientific organisation for Youth Health Care, vaccination registry Vaccinnet and yearly symposium on immunization
 - Wallonia-BXL:
 - Parents: School Health Services, GP, Pharmacist,
 - Vaccinators: School Health Services, Organisation of Well-baby clinics (ONE), specific vaccination website (<http://vaccination-info.be/>), yearly symposium on immunization



Overview of the HPV vaccination program (4)

Le préservatif protège-t-il d'une infection à HPV ? Les préservatifs permettent de réduire le risque d'infection mais ne protègent pas totalement contre une infection par le HPV car celui-ci peut se transmettre par un contact de peau à peau. Il n'offre donc pas une protection à 100 % contre le HPV. Le port du préservatif reste cependant recommandé pour se protéger d'autres maladies sexuellement transmissibles, comme le SIDA, par exemple, et se prémunir d'une grossesse non désirée.

@-vax Depuis janvier 2014, la FWB met en place progressivement, pour tous les vaccinateurs, un nouveau système de commandes de vaccins lié à la constitution d'un registre de données vaccinales pour les enfants de 0 à 20 ans.

Cette centralisation permettra d'éviter des injections supplémentaires liées à la perte de documents vaccinaux attestant d'une vaccination.

Dans le respect des règles de la protection de la vie privée, chaque vaccinateur est donc invité à noter dans ce registre les vaccinations qu'il réalise.

Lors des prochaines vaccinations de votre enfant, le médecin vous fournira de plus amples informations. Si vous ne souhaitez pas que ses données vaccinales soient enregistrées vous pouvez le lui signaler.

Seuls les médecins vaccinateurs ont actuellement accès à ce registre.

Lecture rapide

De quel parle-t-on ? De la gratuité du vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) et de son nouveau schéma en 2 doses.

Pour qui ? Les filles inscrites en 2^{ème} année de l'enseignement secondaire, en 1^{ère} D (différenciée) et celles qui fréquentent l'enseignement spécialisé (âgées de 13-14 ans).

Pourquoi ? Pour les protéger à long terme du cancer du col de l'utérus.

Comment ? Par 2 doses de vaccin (à 6 mois d'intervalle, jusqu'à 14 ans révolus).

Quand ? Durant l'année scolaire en cours, de préférence avant les premières relations sexuelles, même si la jeune fille n'a pas encore eu ses premières règles.

Le vaccin fait-il mal ? L'injection dans le bras provoque une douleur passagère.

Qui peut vacciner ? Le médecin scolaire, le médecin traitant, le pédiatre, le gynécologue ou le médecin de planning familial.

Le vaccin est-il sûr ? Oui. Les effets indésirables disparaissent en quelques heures ou en quelques jours.

Quel autre moyen de protection ? Le dépistage par frottis de col de l'utérus tous les 3 ans reste indispensable pour toutes les femmes et jeunes filles de 25 à 65 ans, qu'elles soient vaccinées ou non contre le HPV.

Pour en savoir plus, consultez le site www.sante.civib.be, rubrique "vaccination".

Nouveau schéma vaccinal en 2 doses
Vaccin gratuit
Edition Juin 2014

Inkele veelgertelde vragen over de HPV-vaccinatie

Wie kan gratis ingeënt worden?
Het gratis vaccin tegen HPV wordt jaarlijks aangeboden aan alle meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen. Meisjes vanaf het tweede jaar secundair onderwijs kunnen wel gevaccineerd worden door de huisarts, maar niet met de gratis vaccins en niet door het CLB. Voor hen is er een gedeeltelijke terugbetaling bij de aankoop van het vaccin in de apotheek.

Waarom zijn er twee inentingen nodig?
Na één inenting maakt je lichaam nog niet voldoende afweerstoffen aan om goed en langdurig beschermd te zijn tegen een besmetting met de HPV-types. Bij de tweede inenting wordt de afweerreactie versterkt, waardoor je voldoende beschermd bent. Stoppen na één inenting is niet gewaardijkt, maar je bent dan niet voldoende beschermd tegen het virus.

Hoe groot is de kans dat je ooit een HPV-infectie oploopt?
Die kans is groot. Meer dan 80% van de mensen loopt vroeg of laat een HPV-infectie op. Meestal merken ze daar niets van. Het virus wordt het meest verspreid op vrij jonge leeftijd.

"Ik heb de folder gelezen, maar ik zit nog met vragen."

Extra informatie vind je op onze website www.sorg-en-gezondheid.be/HPV.

Voor meer informatie kun je ook altijd terecht bij de huisarts of het CLB.

Of stel je vraag aan de Vlaamse overheid. **Bel gratis 1700.**

www.sorg-en-gezondheid.be

TWEE PRIJKES NU KUNNEN JE LATER VEEL LEED BESPAREN

Gratis inenting tegen baarmoederhalskanker voor alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen.

AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID

13-14 ans

La vaccination papillomavirus des jeunes filles !

Nouveau schéma vaccinal en 2 doses
Vaccin gratuit
Edition Juin 2014

Overview of the HPV vaccination program (5)

- Vaccine registry (Vaccinnet – E-vax)
 - Program to order vaccines that are free of charge and through which vaccines free of charge are also registered.
 - Flanders: since 2005 for school health services, 2006 for GPs and pediatricians
 - Wallonia-BXL: since 2014



Major stakeholders or societal-historical factors with role and impact on the program.

- Adolescents and parents
- School doctors and school nurses
- GP, paediatricians, gynaecologists
- Academia
- General public
- Organised anti-vaccine groups
- Government



Swot analysis of the HPV program

- **Strengths:**

- School-based vaccination programs with additions from GP and paediatricians → entirely free of charge (vaccine and consult)
- Vaccines available at site of vaccination
- Flanders: coordinated action between SHS, academia and government (agency and vaccination board) to act when “rumours” circulate

- **Weakness:**

- Undervaccinated groups:
 - Girls with chronic conditions: lower coverage due to lack of communication between treating physician and school doctor
 - Orthodox Jews
- Differences in uptake in different parts of the country: information to parents and the girls
- Vaccination coverage study in Flanders: not a recent measurement (2012 coverage measured in 2016)



Swot analysis of the HPV program

- Number of HPV vaccine doses delivered to vaccinators

schoolyear	July-December	January-June	total	main birth cohort	equivalent fully vaccinated
2010-2011	55,088	41,392	96,480	1998	32,160
2011-2012	54,271	39,474	93,745	1999	31,248
2012-2013	53,433	40,157	93,590	2000	31,197
2013-2014	52,332	42,544	94,876	2001	31,625
2014-2015	39,269	30,033	69,302	2002	34,651
2015-2016	35,025	28,736	63,761	2003	31,881
2016-2017	35,596	28,933	64,529	2004	32,265



Swot analysis of the HPV program

- **Opportunities:**


- Collaboration between school health services, GPs and gynaecologists
- Collaboration between Flanders and Wallonia-BXL
- Information campaigns
- Improved communication with Agency through Vaccine registry

- **Threats:**

- Loss in vaccine confidence through increased hesitancy with rumours spreading fast over social media



Vaccine hesitancy in parents of 16-year old girls - Flanders



Data from 477 girls (born in 2000) of 488 interviewed (97.7%)



Vaccine hesitancy in parents of 16-year old girls - Flanders

- Factors associated with incomplete vaccination are
 - parent with age >50 years*,
 - non-core family*
 - non-Belgian origin (European**, non-European***)
- Factors associated with higher tendency to disagree with statements on vaccination in general were scarce and associated with only one or two statements, except for parents of non-Belgian origin.
- Parents from girls who had an incomplete or no HPV-vaccination
→ significant higher tendency to disagree with most statements on vaccination, but not regarding adverse events following vaccination.

