

Schoolbeleid Hoofdluizen

Preventieve maatregelen

- Maak concrete afspraken met het CLB over het schoolbeleid rond hoofdluizen. Deze afspraken worden best opgenomen in de afsprakennota of de Bijzondere Bepalingen. Het thema hoofdluizen kan opgenomen worden in het gezondheidsbeleid.
- Informeer alle ouders bij het begin van elk schooljaar en bij elke nieuwe inschrijving over de diagnose en behandeling van hoofdluizen en spoor hen aan om de haren van hun kind(eren) regelmatig te controleren met de nat-kam-test. Informeer hen ook over het schoolbeleid rond hoofdluizen. Vraag ouders om bij vaststelling van luizen bij hun kind steeds de leerkracht, de school of de CLB-arts op de hoogte te brengen.
- Informatie rond de diagnose en behandeling van luizen en rond het schoolbeleid kan opgenomen worden op de website van de school.
- Zorg voor een snelle en open communicatie met leerlingen, ouders en leerkrachten.
- Er zijn ook enkele algemene preventieve maatregelen die men kan toepassen om de kans op besmetting met luizen te verminderen:
 - kapstokken zouden minstens 15 cm uit elkaar moeten hangen en overvolle kapstokken moeten vermeden worden;
 - gemeenschappelijk gebruik van bijvoorbeeld haarborstels, mutsen, sjaals, hoofddeksels, handdoeken, bedlinnen of knuffels moet vermeden worden;
 - hoofd-hoofdcontact moet te allen tijde vermeden worden.
- Betrek ouders bij het schoolbeleid rond hoofdluizen.
- Stigmatisering van leerlingen uit haardgezinnen of andere leerlingen met hoofdluizen moet absoluut vermeden worden.

Maatregelen te nemen bij het vaststellen van/een melding van hoofdluizen

- Kinderen met luizen mogen **nooit geweerd** worden van school. Er is geen bewijs beschikbaar dat wering van school doeltreffend is.
- Informeer ouders, medeleerlingen en personeel over de diagnose en de behandelingsmethode indien er in een klas een kind gesignaleerd wordt met luizen:
 - Zorg ervoor dat het kind over wie de melding gaat, correct behandeld wordt. Volg het op.
 - Zorg ervoor dat ouders van klasgenoten worden geïnformeerd zodat ze de haren van hun kind(eren) kunnen controleren met de nat-kam-test en bij het vinden van luizen kunnen behandelen op een correcte manier.

- Informeer ouders dat bij het vinden van luizen bij hun kind ook de andere gezinsleden moeten nagekeken worden en zo nodig behandeld moeten worden. Het is van groot belang dat iedereen die besmet is met luizen binnen eenzelfde klas en binnen eenzelfde gezin gelijktijdig behandeld wordt.
- Betrek het CLB wanneer het luizenprobleem hardnekkig aanwezig blijft bij een individuele leerling of binnen een klasgroep.
- Bij besmetting met luizen in een klas is het belangrijk om extra aandacht te hebben voor het gebruik van de kapstokken. Overvolle kapstokken moeten dan zeker vermeden worden. Indien dit niet mogelijk is, kunnen kinderen hun jas, muts en sjaal best afzonderlijk in een eigen plastic zak bewaren. Er bestaan ook zogenaamde “luizententjes” om over de jas te hangen.
- Bij hardnekkige epidemieën en in geval van haardgezinnen kan desinfectie zinvol zijn om herinfectie te vermijden. Kledij, handdoeken, beddengoed en knuffels die tot 48 uur voor de start van een behandeling gebruikt werden, moeten gewassen worden op 60°C. Na één week dient opnieuw alles op 60°C gewassen te worden. Materialen die niet in de wasmachine mogen, kunnen ook buiten gelucht worden gedurende 48 uur, in de diepvriezer op -18°C geplaatst worden gedurende 24 uur of in een afgesloten plastic zak bewaard worden gedurende twee weken.